

製品名

第3類医薬品

アスナルミン

成分及び分量

1日量 3錠中(1錠:220mg)

[規格]	[成分名]	[分量]
日局	フルスルチアミン塩酸塩 (フルスルチアミンとして100mg)	109.16 mg
日局	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)	103.58 mg
日局	ピリドキシン塩酸塩	100 mg
日局	ニコチン酸アミド	60 mg
別紙規格	ガンマーオリザノール	10 mg
日局	パントテン酸カルシウム	30 mg
日局	シアノコバラミン	1500 μ g

用法及び用量

15歳以上 1回 2~3錠

1日1回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

効能又は効果

次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、
眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、
医師又は薬剤師に相談すること。」次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

性状

黄色のフィルムコーティング錠